

MAIMI PAINT S.L.
C. Ciudad de Sevilla 5
46988 Paterna (Valencia) España.
+ 34 610 32 68 81



VIKING BY DYNAMIC SUNFLOWER YELLOW

Mieszanka do stosowania w tatuowaniu.

Skład koloru: woda, gliceryna, CI 77891, CI 19140, woda z oczaru wirginijskiego, glikol butylenowy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania: Najlepiej dla jednego użytkownika.

Przygotować obszar do pigmentowania w odpowiednich warunkach aseptycznych.

Dokładną ilość produktu umieścić w indywidualnym sterylnym i jednorazowym pojemniku (kubeczku).

Po zakończeniu prac pojemnik i pozostała zawartość zostaną zlikwidowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Za pomocą jednorazowej jednorazowej sterylnej igły wszczepić produkt. Personel wykonujący aplikację musi używać rękawiczek chirurgicznych.

Środki ostrożności: Test na alergię skórą będzie zawsze przeprowadzany z wyprzedzeniem dla każdego używanego produktu przez wykwalifikowanego specjalistę. Zawiera nikiel i/lub chrom (VI). Może powodować reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia: Nigdy nie wkładaj igły do pojemnika.

Nigdy nie używaj produktu pozostałego z opakowania ani do retuszu klienta.

Używać sterylnych, jednorazowych igieł i pojemników.

Nie wdychać ani nie połykać zawartości.

Nie przenosić w pojemniku. Jeśli zauważysz, że pojemnik został naruszony, wyrzucić go.

Przechowywać pojemnik w odpowiednim miejscu do przechowywania, aby zachować stabilność.

Po wykonaniu mikropigmentacji nie należy wykonywać żadnych manipulacji na obszarze implantu.

Po wykonaniu pigmentacji nie należy stosować makijażu ani soczewek kontaktowych, przez co najmniej 8 dni od upływu pigmentacji.

Po wykonaniu mikropigmentacji nie należy wykonywać żadnych manipulacji na obszarze implantu.

Zaleca się nie opalać się (sztucznie lub naturalnie) do 3 miesięcy po implantacji.

Zalecenia: Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę następujące obserwacje: · Szczególną troską są osoby: cukrzyca, z osłabieniem immunologicznym, z problemami gojenia, kobiety w ciąży, chorzy na hemofilię i inne patologie.

· Nie zaleca się stosowania produktu u osób dotkniętych grzybami, miejscowym zapaleniem skóry, miejscowym zapaleniem skóry, stłuczeniami, oparzeniami słonecznymi, znamionami, bliznowcami, nieustabilizowanymi bliznami, rakiem skóry, egzemą, łuszczycą, miejscowym stanem zapalnym, reakcjami alergicznymi.

· Stan zdrowia fizycznego i psychicznego klienta przed wykonaniem implantacji musi być odpowiedni.

· W przypadku zatrucia lub przypadkowego połyknięcia zawiadzić do Służby Medycznej Informacji Toksykologicznej w swoim kraju.

Zobacz w karcie charakterystyki produktu kontaktowego w swoim kraju/regionie.

Czas trwania implantacji: Pigmentacja będzie różnić się w zależności od rozmiaru, który ma być wykonany, nie przekraczając 4 godzin od implantacji.

Eliminacja implantacji: Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wyeliminowaniu implantacji, musi to zrobić lekarz specjalista.

Specyficzne warunki przechowywania produktu: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Nie wystawiać na słońce.